

Cornouiller Sanguin



Autres Nom(s) : Sanguine, bois puant, bois punais, bois rouge, cornouiller femelle

Nom latin : *Cornus sanguinea*

Famille : Cornaceae

Statut de protection :
Préoccupation mineure (LC)



Floraison :

Entre mai et juillet.

Fructification :

Entre septembre et octobre.

Description : Fruit non comestible étant premièrement rouge puis virant au noir.



Description : malgré une taille pouvant atteindre jusqu'à 4 mètres de haut, le cornouiller sanguin est considéré comme un arbrisseau. Il tire son nom de la couleur rouge de ses tiges. Il nécessite un ensoleillement constant.



Type de feuille :

Les feuilles sont ovales et finissant en pointe. Leur couleur varie entre le rouge et le vert et disposent de poils fins sur leur partie inférieure.

Bourgeons :

La tige présente toujours des bourgeons opposés qui forment ensuite un pétiole court donnant sur la feuille.



Particularités :

Plante toxique pour l'homme dont l'ingestion en grande quantité peut entraîner une gastro-entérite.

Utilisations :

Par le milieu : plante mellifère exploitée par les abeilles.

Par l'Homme : le bois sert à la menuiserie et les fruits à la production d'huile.



Liens externes :

Photo 1 : "[20130608Hartriegel Buergerpark1](#)" par AnRo0002 sans Licence ([CCO 1.0](#)) ;

Photo 2 : "[CORNUS SANGUINEA - VALLFEROSA - IB-068 \(Sanguinyol\)](#)" par Isidre Blanc sous Licence [CC BY-SA 4.0](#) ;

Photo 3 : "[20140216Hartriegel Neulussheim4](#)" par AnRo0002 sans Licence ([CCO 1.0](#)) ;

Photo 4 : "[Forêt de la Robertsau-Cornouiller sanguin](#)" par Ji-Elle sous Licence [CC BY-SA 3.0](#)

Carte : "[Cornus sanguinea range](#)" par Giovanni Caudullo ([DOI : 10.1016/j.dib.2017.05.007](#)) sous Licence [CC BY 4.0](#) - Carte Modifiée